

SUBFERRINA®

CPR SUBLINGUALI

GRAZIE ALLA SOMMINISTRAZIONE SUBLINGUALE LA LATTOFERRINA VIENE ASSORBITA SENZA SUBIRE MODIFICHE STRUTTURALI.

► **RISULTATI OTTIMI & STANDARDIZZATI.**


Per tutti i tipi di acne e dermatosi infiammatorie.
Può essere utilizzata anche per lunghi periodi.

**MODULA
LA PRODUZIONE
DI SEBO**

Regola la proliferazione dei Cheratinociti

Svolge un'azione antiinfiammatoria

Ha attività antibatterica




STUDIO CLINICO (Bruno F., Castelpietra R.)

Design Studio n° pazienti: 50; età: 15-35;
durata 3M, 2 cpr Subferrina/die.


1- TLC lesioni infiammatorie e lesioni totali

TOTAL LESION COUNT (TLC)




2- Totale lesioni infiammatorie

TLC INFIAMMAZIONE




3- Gravità della malattia con scala 1:100 PhGA

PHGA



4- Valutazione sebometria

SEBOMETRIA



ALAFAST® GEL (1% E 5%)

FOTOSENSIBILIZZANTE PER FOTODINAMICA

CON UN VEICOLO UNICO E BREVETTATO
L'ACIDO 5-AMINOLEVULINICO (5-ALA)
SI APPLICA COME UNA NORMALE CREMA.
▶ **NON RICHIEDE IL BENDAGGIO OCCLUSIVO.**

Per acne con marcata componente infiammatoria, acne nodulocistica e dermatosi infiammatorie.
Si può utilizzare anche la luce solare (Daylight) in modo sicuro e preciso grazie all'applicazione Alafast dosimetro.

FOTODINAMICA

Azione
SEBOREGOLATRICE

Azione
ANTIBATTERICA

Azione
ANTIINFIAMMATORIA

Efficacia, sicurezza, ripetibilità senza utilizzare farmaci e senza interferire con altri trattamenti.

La fotodinamica è efficace anche in caso di dermatosi infiammatorie, couperose, rosacea e dermatite seborrofica.

**FOTODINAMICA
ALAFAST**

**MIGLIOR
COMPLIANCE**
dosaggio ponderato
e preciso dell'attivo

**MINOR ROSSORE
E BRUCIORE,**
penetrazione rapida

**MINOR ATTESA PRIMA
DELL'ESPOSIZIONE
ALLA LUCE ROSSA**

